

Procactive



Wartezeit

**Procactive:
100 ml & 250 ml**

**300 mg/ml Injektionssuspension
für Rinder und Schweine
Benzylpenicillin-Procaïn 1 H₂O**



Pflichtangaben s. Rückseite

www.bela-pharm.com

bela-pharm
Arzneimittelfabrik

Procactive



Hinweis: Unvollständige Kurzfassung. Eine detaillierte Produktinformation erhalten Sie auf unserer Homepage www.bela-pharm.com oder bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

300 mg/ml Injektionssuspension für Rinder und Schweine Benzylpenicillin-Procaïn 1 H₂O

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Procactive 300 mg/ml Injektionssuspension für Rinder und Schweine. Benzylpenicillin-Procaïn 1 H₂O

WIRKSTOFF(E)

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H ₂ O (entspr. 170 mg Benzylpenicillin)	300 mg/ml
--	-----------

SONSTIGE BESTANDTEILE

Natriummethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur) (E219)	1,25 mg/ml
Weißer Suspension	

ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von systemischen Infektionen bei Rindern und Schweinen (mit einem Gewicht von mehr als 25 kg), die durch Penicillin-empfindliche Bakterien verursacht werden.

GEGENANZEIGEN

Nicht intravenös injizieren.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Penicillinen, Cephalosporinen, Procain oder einem der sonstigen Bestandteile.

Nicht anwenden bei schwerer Nierenfunktionsstörung mit Anurie und Oligurie.

Nicht anwenden bei Vorliegen von β -Lactamase-produzierenden Bakterien.

Nicht anwenden bei sehr kleinen Herbivoren wie Meerschweinchen, Wüstenrennmäusen und Hamstern.

ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine (mit einem Gewicht von mehr als 25 kg).

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

Die empfohlene Dosierungsrate beträgt 10 mg/kg Körpergewicht Procain-Benzylpenicillin (entspricht 5,66 mg Benzylpenicillin), dies entspricht täglich 1 ml pro 30 kg Körpergewicht über 3–5 Tage.

Bei Schweinen nicht mehr als 2,5 ml pro Injektionsstelle injizieren.

Bei Rindern nicht mehr als 12 ml pro Injektionsstelle injizieren.

Wenn innerhalb von 3 Tagen kein klinisches Ansprechen zu beobachten ist, die Diagnose neu ermitteln und die Behandlung, falls erforderlich, ändern. Das Körpergewicht sollte so genau wie möglich bestimmt werden, um eine Dosierung zu gewährleisten und eine Unterdosierung zu vermeiden.

WARTEZEITEN

Schweine: Essbare Gewebe:	6 Tage
Rinder: Essbare Gewebe:	6 Tage
Milch:	96 Stunden (4 Tage)

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Im Kühlschrank lagern (2 °C–8 °C).

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „EXP:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage bei 2 °C–8 °C.

WEITERE ANGABEN

In-vitro-Tests haben gezeigt, dass die folgenden Organismen empfindlich sind: *Listeria spp.*, *Mannheimia haemolytica*, *Staphylococcus spp.* (non-penicillinase producing) und *Trueperella pyogenes*.

ZULASSUNGSINHABER UND HERSTELLER

Laboratorios SYVA S.A.U.

Avda. Párroco Pablo Díez 49–57, 24010 León, Spanien

MITVERTRIEB

bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Straße 19, D-49377 Vechta

Zul.-Nr.: 402490.00.00

Stand: März 2019

Verschreibungspflichtig